

۱- اختلال ادواری خویی چیست؟

۱. حالت خفیف اختلال افسردگی است.
۲. یک حالت فصلی است و فقط در زمستان رخ می دهد.
۳. حالت خفیف تر اختلال افسردگی اساسی و اختلال دو قطبی است.
۴. نشانه اصلی آن پر نیرویی افراطی است.

۲- پایان یک رابطه محبت آمیز منجر به می شود.

۱. اختلال افسردگی اساسی
۲. واکنش سوگ
۳. افسردگی فصلی
۴. افسردگی بهنجار

۳- طبق DSM، حداقل چند مورد و چه مدتی باید علائم وجود داشته باشد تا بتوان تشخیص اختلال افسردگی را بر فرد گذاشت؟

۱. ۹ مورد- دو هفته
۲. ۹ مورد- یک ماه
۳. ۵ مورد- دو هفته
۴. ۵ مورد- یک ماه

۴- کدامیک از موارد زیر جزء نشانه های انگیزشی افسردگی محسوب نمی گردد؟

۱. فلج ارادی
۲. کندی گفتار
۳. افکار خودکشی
۴. نگرانی مفرط در مورد سلامتی

۵- افسردگی مضاعف ترکیبی از..... است.

۱. افسرده خویی و افسردگی فصلی
۲. افسردگی خویی و افسردگی اساسی
۳. افسردگی درون زاد و افسردگی برون زاد
۴. افسردگی یک قطبی و افسردگی فصلی

۶- چه چیزی باعث تمایز افسردگی درون زاد از افسردگی برون زاد شده است؟

۱. مدت زمان بروز علائم
۲. نوع علائم
۳. علل ایجاد کننده اختلال
۴. شدت علائم

۷- کدامیک از اسنادهای زیر مانع افسردگی می شود؟

۱. اسناد درونی
۲. اسناد پایدار
۳. اسناد بیرونی
۴. اسناد کلی

۸- فرد افسرده ای که اعتقاد دارد بدشانس است چون همیشه با شکست مواجه می شود دارای چه خطای منطقی است؟

۱. استنباط دلخواه
۲. انتزاع گزینشی
۳. تعمیم مفرط
۴. شخصی سازی

۹- کدامیک از موارد زیر نمی تواند جز علل ایجاد SAD مطرح گردد؟

۱. هورمون ملاتونین
۲. هورمون سرتونین
۳. عوامل شناختی
۴. عوامل ژنتیک

۱۰- کدامیک از موارد زیر جزء ویژگی های شناختی دوره های شیدایی نمی باشد؟

۱. پرش افکار
۲. ناتوانی در اخذ تصمیم
۳. رفتار تکانشی
۴. هذیان بزرگ منشی

۱۱- کدامیک از هورمون های زیر باعث مانیا می شود؟

۱. سرتونین بالا
۲. نوراپی نفرین پایین
۳. سرتونین پایین با نوراپی نفرین پایین
۴. سرتونین پایین با نوراپی نفرین بالا

۱۲- کدام نوع از انواع اسکیزوفرنیا به هبفرنیا معروف است؟

۱. پارانوئید
۲. آشفته
۳. کاتاتونیک
۴. باقیمانده

۱۳- کدام یک از موارد زیر با پیش آگهی ضعیف اسکیزوفرن در ارتباط نیست؟

۱. مونث بودن
۲. هوش پایین
۳. شروع زودرس
۴. طبقه اجتماعی پایین

۱۴- کدامیک از عبارت های زیر صحیح نمی باشد؟

۱. کاهش جریان خون ناحیه ای مغز در کرتکس پره فرونتال چپ باعث فقر روانی- حرکتی می شود.
۲. کاهش جریان خون ناحیه ای مغز در کرتکس پره فرونتال میانی راست باعث سازمان نیافتگی می شود.
۳. افزایش جریان خون ناحیه ای مغز در بروکا باعث تحریف واقعیت می شود.
۴. افزایش جریان خون ناحیه ای مغز در ورنیکه باعث توهم شنوایی می شود.

۱۵- چرا کودکان متولد شده در ماه های زمستان نسبت به کودکان متولد شده در تابستان بیشتر در معرض خطر ابتلا به اسکیزوفرنیا هستند؟

۱. افزایش دوپامین
۲. صدمات مغزی هنگام زایمان
۳. عفونت ویروسی
۴. افزایش آمفتامین

۱۶- طبق نظریه دوسوکور:

۱. استرس بالا مربوط به پایگاه اجتماعی- اقتصادی برانگیزاننده شروع اسکیزوفرن در افراد آسیب پذیر است.
۲. اسکیزوفرنیا پیامد پرورش بوسیله مادری است که به نظر فداکار می رسد ولی در واقع خود محور و مستبد است.
۳. شیوه های برخورد متضاد والدین با فرزندان باعث سردرگمی و ایجاد استرس در فرزندان شده که منجر به بروز علائم اسکیزوفرن می شود.
۴. هیچکدام

۱۷- طبق مدل شناختی همزلی :

۱. ضعیف شدن اثر زمینه ادراکی قبلاً ذخیره شده از محرک، در ظهور علائم سایکوز نقش دارند.
۲. نیمکره راست مغز اسکیزوفرن ها فعالتر از نیمکره چپ آنهاست.
۳. اسکیزوفرن ها با محیط فیزیکی خود درگیری فوری و مطلق دارند.
۴. سیستم پیشانی آسیب دیده یک جنبه اصلی اسکیزوفرنی است.

۱۸- مدیریت استرس جزء کدام دسته از درمان های اسکیزوفرنیا قرار دارد؟

۱. درمان روان تحلیل گرایانه
۲. درمان شناختی
۳. درمان شناختی رفتاری
۴. درمان رفتاری

۱۹- اختلال شخصیت اسکیزوئید جزء کدام دسته از اختلالات شخصیت قرار می گیرد؟

۱. هیجانی
۲. نامتعارف
۳. مضطرب
۴. ترسو

۲۰- کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد؟

۱. تشخیص اختلال شخصیت از دوره نوجوانی یا کودکی می باشد.
۲. اختلال شخصیت خود شیفته و مرزی بیشتر در مردان شایع است.
۳. سطح شیوع شخصیت ضد اجتماعی با افزایش سن، زیاد می شود.
۴. طبق مدل شناختی، اختلالات شخصیت از یک مثلث شناختی مربوط به خویشتن، دیگران و آینده حاصل می گردند.

۲۱- تنهایی مفرط و بی علاقگی نسبت به روابط اجتماعی، علامت بارز کدام اختلال شخصیت است؟

۱. اسکیزوتایپال
۲. اسکیزوئید
۳. دوری گزین
۴. مرزی

۲۲- مکانیسم دفاعی اصلی شخصیت های نمایشی چیست؟

۱. واپس زدن ۲. واکنش معکوس ۳. برون سازی ۴. دلیل تراشی

۲۳- خود آسیب زنی خصوصیات بارز کدام اختلال شخصیت است؟

۱. اسکیزوتایپال ۲. مرزی ۳. ضد اجتماعی ۴. هر سه مورد

۲۴- بهترین درمان شناختی برای افراد مبتلا به شخصیت مرزی چیست؟

۱. تغییر طرحواره های شناختی ۲. آموزش آگاهی هیجانی
۳. آموزش مهارت های اجتماعی ۴. درمان معطوف به خانواده

۲۵- کدام یک از موارد زیر جز شباهت های اختلال بی اشتهایی و پر اشتهایی روانی محسوب نمی گردد؟

۱. هر دو گروه از چاق شدن می ترسند. ۲. با احساس اضطراب و افسردگی درگیرند.
۳. نسبت به جاذبه جنسی بی تفاوتند. ۴. توجه زیادی به وزن ظاهری خود دارند.

۲۶- کدام یک از موارد زیر در مورد اختلال بی اشتهایی روانی صدق نمی کند؟

۱. بین زنان طبقه اجتماعی بالاتر شایع است. ۲. جرات مندی و عزت نفس بالایی دارند.
۳. سطح سواد بالایی دارند. ۴. اشتغال ذهنی بالایی در مورد خوردن دارند.

۲۷- طبق کدام نظریه بیمار مبتلا به بی اشتهایی فاقد احساس خودمختاری و خود بودن است؟

۱. شناختی ۲. رفتاری ۳. طرحواره ای ۴. روان تحلیلی

۲۸- نظریه نقطه تثبیت به کدام قسمت مغز مربوط می شود؟

۱. هیپوتالاموس ۲. هیپوفیز ۳. تالاموس ۴. آمیگدال

۲۹- شب ادراری در کدام مرحله خواب اتفاق می افتد؟

۱. اول ۲. دوم ۳. سوم ۴. Non REM

۳۰- توهمات پیش از خواب..... نام دارد.

۱. هیپنوپامپیک ۲. هیپناگوژیک ۳. کاتاپلکسی ۴. فلج خواب

۳۱- کدام یک از اختلالات زیر جز پاراسومیناها نمی باشد؟

۱. وحشت شبانه ۲. خوابگردی ۳. نارکولپسی ۴. کابوس

۳۲- اختلال اوج لذت جنسی جزء کدام دسته از اختلالات می باشد؟

۱. اختلال میل جنسی
۲. اختلال تحریک جنسی
۳. اختلال اوج لذت جنسی
۴. اختلال درد جنسی

۳۳- کدام اختلال مختص زنان است؟

۱. مقاربت دردناک
۲. واژینیسم
۳. اختلال ارگاسم
۴. اختلال میل جنسی

۳۴- طبق نظریه روانکاوی کدام اختلال جنسی نشانگر مکانیسم دفاعی برگشت است؟

۱. مبدل پوشی
۲. تماشاگری
۳. مالش دوستی
۴. نمایشگری

۳۵- عدم توانایی تشخیص و شناسایی اشیاء در افراد مبتلا به آلزایمر چه نامیده می شود؟

۱. آگنوزیا
۲. آپراکسی
۳. آفازی
۴. آمنزی

۳۶- مهمترین انتقال دهنده عصبی مرتبط با بیماری الزایمر کدام است؟

۱. سرتونین
۲. نوراپینفرین
۳. هیپوکرتین
۴. استیل کولین

۳۷- تخریب غلاف میلین اطراف نوروں های مغزی باعث کدام اختلال می گردد؟

۱. آلزایمر
۲. مالتیپل اسکلروزیس
۳. پارکینسون
۴. صرع

۳۸- معروفترین درمان دارویی پارکینسون چیست؟

۱. ترازودن
۲. بازدارنده های جذب سرتونین

۳. ال - دوپا
۴. فلوکسیتین

۳۹- حملاتی که در آن هشیاری آسیب می بیند کدام نوع تشنج را مشخص می کند؟

۱. ساده
۲. پیچیده
۳. محدود
۴. کلی

۴۰- ساده ترین شاخص شدت صدمه به سر کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. طول مدت درمان
۲. شدت آسیب وارده به سر
۳. استانه تحمل درد
۴. طول مدت لازم برای پیروی دستورات

2	ب
3	ج
4	د
5	ب
6	ج
7	ج
8	ج
9	ج
10	ب
11	د
12	ب
13	الف
14	د
15	ج
16	ج
17	الف
18	ج
19	ب
20	د
21	ب
22	الف
23	ب
24	ب
25	ج
26	ب
27	د
28	الف
29	ج
30	ب
31	ج
32	ج
33	ب
34	الف
35	الف
36	د
37	ب
38	ج
39	ب
40	د

۱- مؤثرترین درمان برای اختلال شخصیت ضداجتماعی متمرکز به کدام گزینه زیر است؟

۱. شناخت ۲. خانواده ۳. رفتار ۴. دارو

۲- اصطلاح هبفرنیا به کدام نوع اسکیزوفرنیا گفته می شود؟

۱. پارانوئید ۲. آشفته ۳. کاتاتونیک ۴. باقی مانده

۳- خودکشی در افراد دارای اسکیزوفرنی بیشتر در نتیجه چیست؟

۱. یأس و ناامیدی ۲. هذیان و توهم ۳. داروهای مصرفی ۴. ناآرامی درونی

۴- به وضعیتی که در آن خُلق فرد بین دوره هایی از افسرده خویی و رفتار هیپومانیاپی در نوسان است، چه گفته می شود؟

۱. اختلال عاطفی فصلی ۲. اختلال افسرده مضاعف
۳. اختلال ادواری خویی ۴. اختلال دوقطبی

۵- خُلق حاکم در حالت مانی کدام مورد زیر می باشد؟

۱. حساسیت کم ۲. تحریک پذیری ۳. کم فعالی ۴. ناآرامی درونی

۶- از عواملی که سبب ایجاد اختلال وابسته می شود کدام مورد زیر است؟

۱. ابتلاء به بیماری در دوره کودکی ۲. وجود والدین بسیار بی تفاوت
۳. والدین سخت گیر ۴. والدین خشن

۷- طبق طبقه بندی DSM-IV افسردگی همراه با مالیخولیا چه نامیده می شود؟

۱. افسردگی برون زاد ۲. اختلال افسرده خویی
۳. افسردگی مضاعف ۴. افسردگی درون زاد

۸- بنظر لوینسون و همکاران عامل به وجود آورنده افسردگی چیست؟

۱. خُلق پایین و کاهش رفتارهای مستحق پاداش ۲. ایجاد برنامه نفع ثانوی
۳. مورد توجه قرار گرفتن به خاطر رفتارهای افسرده وار ۴. میزان کم تقویت اجتماعی مثبت

۹- از ویژگیهای اصلی اختلال شخصیتی وسواسی- جبری کدام است؟

۱. اجتناب از روابط نزدیک ۲. داشتن عقاید انتساب
۳. کمال گرایی ۴. تمایل به روابط نزدیک

۱۰- در نظر کراپلین کدام بیماری با دوره هایی از عود مجدد و بهبودی نسبی مشخص می شود؟

۱. اسکیزوفرنی
۲. جنون زودرس
۳. جنون مانیک - دپرسیو
۴. روان گسیختگی

۱۱- نامی که کراپلین برای اسکیزوفرنی نهاده بود چیست؟

۱. ذهن پاره پاره
۲. دوپارگی
۳. روان گسیختگی
۴. زوال عقلی زودرس

۱۲- یکی از مشکلات مهم هم آیند با بیماری MS چیست؟

۱. استرس
۲. افسردگی
۳. آشفتگی هیجانی
۴. درماندگی آموخته شده

۱۳- کدام نوع اسکیزوفرنی با شروع ناگهانی و با احتمال بهبودی زیاد مشخص می گردد؟

۱. اسکیزوفرنی با علائم مثبت
۲. اسکیزوفرنی با علائم منفی
۳. اسکیزوفرنی حاد
۴. اسکیزوفرنی مزمن

۱۴- در کدام نوع حمله های تشنجی، هوشیاری آسیب می بیند؟

۱. ساده
۲. پیچیده
۳. محدود
۴. نوع کلی

۱۵- معروفترین درمان دارویی بیماری پارکینسون چیست؟

۱. فلوکستین
۲. ال - دوپا
۳. ترازودن
۴. داروهای بازدارنده جذب سروتونین

۱۶- ضایعات کدام قسمت مغز در ۹۰٪ موارد باعث ایجاد اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهم شنوایی می شود؟

۱. لوب تمپورال یک یا دو نیمکره
۲. لوب پاریتال راست و چپ
۳. لوبهای فرونتال
۴. بطن های مغزی

۱۷- کم کاری فرونتالی در بیماران اسکیزوفرنیک بوسیله کدام مطالعه تصویربرداری حاصل می شود؟

۱. بررسی جریان خون ناحیه ای مغز
۲. مطالعات الکتروفیزیک
۳. تغییرات ساختاری
۴. مطالعات نوروسایکولوژیک

۱۸- شایع ترین اختلال روان شناختی در بیماران صرعی چیست؟

۱. اختلالات خلقی
۲. اختلالات شخصیتی
۳. افسردگی
۴. اضطراب فراگیر

۱۹- نشانه اصلی اختلالات خُلقی چیست؟

۱. شادی بیش از حد
۲. رفتار مانیا
۳. غمگینی مفرط
۴. افسردگی

۲۰- به نظر بک علت افسردگی چیست؟

۱. کاهش تماسهای اجتماعی
۲. شناخت های منفی
۳. میزان کم تقویت اجتماعی مثبت
۴. محیط خارج از کنترل شخص

۲۱- کدام گزینه زیر از ویژگی های مشترک اختلالات شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپال می باشد؟

۱. هیجانی، خودنما و پرزرق و برق
۲. ترسو و مضطرب
۳. عجیب و غریب یا نامتعارف
۴. فعل پذیر- پرخاشگر

۲۲- کدام اختلال به اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونه معروف است؟

۱. اسکیزوئید
۲. اسکیزوتایپال
۳. پارانوئیدی
۴. مرزی

۲۳- مشکل آفرین ترین عوارض کلرپرومازین کدام است؟

۱. نشانه های خارج هرمی
۲. خشکی دهان و گلو
۳. خواب آلودگی
۴. آشفته گی های بینایی

۲۴- کمک به درمانجو جهت کنار آمدن با مشکلات خانوادگی و خارج خانوادگی، شامل کدام نوع درمان اختلال شخصیت ضداجتماعی می باشد؟

۱. روان درمانی
۲. آموزش آگاهی هیجانی
۳. رویکرد چندسیستمی مبتنی بر خانواده
۴. بهبودی مشکلات ارتباطی

۲۵- طبق طبقه بندی DSM-TV چند درصد وزن بدن مبتلاء به بی اشتهايي روانی از دست می رود؟

۱. ۵ تا ۱۰ درصد
۲. ۱۵ درصد
۳. ۱۰ درصد
۴. ۱۵-۲۰ درصد

۲۶- اختلالات شخصیت پارانوئید دارای کدام ویژگی زیر است؟

۱. بدبینی نسبت به دیگران
۲. حساسیت به نظم
۳. هیجانات شدید
۴. اجتناب از روابط نزدیک

۲۷- کدام ناحیه هیپوتالاموس عامل ایجاد احساس گرسنگی می باشد؟

۱. هیپوتالاموس قدامی
۲. هیپوتالاموس شکمی
۳. تعادل میان دو ناحیه هیپوتالاموس
۴. هیپوتالاموس جانبی

۲۸- دور باطل اضطراب - بیخوابی مربوط به کدام نوع از انواع اختلالات خواب می باشد؟

۱. بیخوابی اولیه
۲. حمله خواب
۳. پر خوابی اولیه
۴. بد خوابی

۲۹- وقفه های تنفسی ۱۰ ثانیه ای موقتی که در طی خواب بوجود می آید چه نامیده می شود؟

۱. ناركولپسی
۲. كابوس
۳. آپنه
۴. وحشت شبانه

۳۰- کدام گزینه در مورد اختلالاتی تغذیه ای صحیح نمی باشد؟

۱. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی می توانند کالری مصرفی خود را تنظیم کنند.
۲. پیامدهای جسمانی پراشتهایی و بی اشتهاهی روانی متفاوتند.
۳. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی تمایل به جلب رضایت دیگران دارند.
۴. افراد مبتلا به پراشتهایی روانی مرضی بودن رفتارشان را می پذیرند.

۳۱- کدام اختلال شخصیتی به شخصیت های هیستریک معروف می باشند؟

۱. شخصیت نمایشی
۲. خودشیفته
۳. اسکیزوتایپال
۴. شخصیت ضداجتماعی

۳۲- کدام اختلال به اختلال شخصیت اجتنابی نیز معروف است؟

۱. وسواسی - جبری
۲. وابسته
۳. منفعل پرخاشگر
۴. دوری گزین

۳۳- استفراغ عمدی پس از خوردن غذا شامل کدام یک از اختلال های تغذیه ای می شود؟

۱. بی اشتهاهی روانی
۲. بی اشتهاهی از نوع محدود کننده
۳. پر اشتهاهی روانی تخلیه ای
۴. پراشتهایی روانی

۳۴- کدام یک از علت های بی اشتهاهی و پراشتهایی روانی به مجموعه ای از باورها و نگرش های تحریف شده نسبت به شکل و وزن بدن تأکید می کنند؟

۱. عوامل اجتماعی - فرهنگی
۲. مکانیسم های زیست شناختی
۳. تبیین روان تحلیل گری
۴. تبیین های روان شناختی

۳۵- حملات غیرقابل مقاومت خواب در طول روز که حداقل به مدت ۳ ماه دوام داشته باشند مربوط به کدام اختلال زیر می باشد؟

۱. نازکولپسی

۲. اختلال خواب مرتبط با تنفس

۳. پاراسومینا

۴. پرخوابی اولیه

۳۶- رفتار عجیب و غریب فرد تا حدی که اطرافیان متوجه مشکل احتمالی فرد مبتلاء به آلزایمر بشوند مربوط به کدام مرحله از طول مدت بیماری می باشد؟

۱. دمانس شدید

۲. دمانس متوسط

۳. دمانس مبهم

۴. دمانس خفیف

۳۷- بالا بودن سطح ماده شیمیایی گاما- اینترفرون در ایجاد کدام بیماری مؤثر شناخته شده است؟

۱. آلزایمر

۲. صرع

۳. پارکینسون

۴. MS

۳۸- نظریه درماندگی آموخته شده توسط چه کسی مطرح شد؟

۱. ابرامسون

۲. سلیگمن

۳. آبل و همکاران

۴. بک

۳۹- حالت خفیف تر اختلال افسردگی اساسی کدام اختلال می باشد؟

۱. اختلال افسرده خویی

۲. افسردگی درون زاد

۳. مانیا (شیدایی)

۴. اختلال ادواری خویی

۴۰- کدام اختلال نورولوژیک زیر رایج ترین نوع دمانس است؟

۱. آلزایمر

۲. پارکینسون

۳. صرع

۴. MS

1	ب
2	ب
3	الف
4	ج
5	ب
6	الف
7	د
8	د
9	ج
10	ج
11	د
12	ب
13	ج
14	ب،د
15	ب
16	الف
17	الف
18	ب
19	د
20	ب
21	ج
22	ب
23	الف
24	ج
25	ب
26	الف
27	د
28	الف
29	ج
30	الف
31	الف
32	د
33	ج
34	الف،د
35	الف
36	ج
37	د
38	ب
39	الف
40	الف،ج

۱. کدام یک از موارد زیر جزء نشانه‌های عصب- رفتاری تجربه شده بوسیله افراد دچار آسیب مغزی نمی‌باشد؟

الف. بی‌قراری ب. سردردها ج. آسیب حافظه‌ای د. خستگی

۲. نظریه درماندگی آموخته شده توسط چه کسی مطرح شد؟

الف. ابرامسون ب. سلیگمن ج. آبل و همکاران د. بک

۳. خودکشی در افراد دارای اسکیزوفرنی بیشتر نتیجه چیست؟

الف. یاس و ناامیدی ب. هذیان و توهم ج. داروهای مصرفی د. ناآرامی درونی

۴. خلق حاکم در حالت مانی کدام مورد زیر می‌باشد؟

الف. حساسیت کم ب. تحریک پذیری ج. کم‌فعالی د. ناآرامی درونی

۵. ویژگی اصلی اختلال شخصیتی اسکیزوئید کدام است؟

الف. اجتناب از روابط نزدیک ب. داشتن عقاید انتساب

ج. کمال‌گرایی د. تمایل به روابط نزدیک

۶. نام قدیمی شخصیت نمایشی، کدام یک از گزینه‌های زیر می‌باشد؟

الف. نارسیسم ب. هیستریک ج. سایکوپات د. اسکیزوفرنی

۷. عواملی که سبب ایجاد اختلال وابسته می‌شوند کدامند؟

الف. ابتلاء به بیماری در دوره کودکی ب. وجود والدین بسیار بی‌تفاوت

ج. والدین سخت‌گیر د. والدین خشن

۸. برای درمان اختلال شخصیت مرزی از چه راهبردی استفاده می‌شود؟

الف. آگاهی هیجانی ب. دارایی

ج. شناختی- رفتاری د. زیستی

۹. رایج‌ترین نوع دمانس در کدام یک از گزینه‌های زیر آمده است؟

الف. آلزایمر ب. پارکینسون ج. صرع د. MS

۱۰. بیشترین درصد مبتلایان به بیماری آلزایمر در چه سنینی هستند؟

الف. بالای ۶۵ سال ب. ۶۰ سال ج. بالای ۸۰ سال د. ۸۰ سال

۱۱. یکی از مشکلات مهم هم‌آیند با بیماری MS چیست؟

الف. استرس ب. افسردگی ج. آشفتگی هیجانی د. درماندگی آموخته شده

۱۲. در حملاتی که هوشیاری آسیب می‌بیند کدام نوع تشنج را مشخص می‌سازد؟

الف. ساده ب. پیچیده ج. محدود د. نوع کلی

۱۳. معروفترین درمان دارویی بیماری پارکینسون چیست؟

الف. فلوکستین ب. ال- دوپا ج. ترازودن د. داروهای بازدارنده جذب سروتونین

۱۴. شایع‌ترین اختلال روان شناختی در بیماران صرعی چیست؟

الف. اختلالات خلقی ب. اختلالات شخصیتی ج. افسردگی د. اضطراب فراگیر

۱۵. نشانه‌های اصلی اختلال خلقی چیست؟

الف. شادی بیش از حد ب. رفتار مانیایی ج. غمگینی مفرط د. افسردگی

۱۶. سن معمولی برای شروع افسردگی چند سال می باشد و بیشتر در میان چه جنسی شایع می‌باشد؟

الف. ۲۴ و ۲۹ ، زنان ب. ۲۴ و ۳۹ ، مردان

ج. ۲۰ و ۲۵ ، به طور مساوی د. ۳۰ و ۳۵ ، زنان

۱۷. به نظر لوینسون و همکاران علت افسردگی چه چیزی می‌باشد؟

الف. کاهش تماسهای اجتماعی ب. پاداش به خاطر رفتارهای افسرده‌وار

ج. میزان کم تقویت اجتماعی مثبت د. محیط خارج از کنترل شخص

۱۸. میزان خودکشی و مرگ و میر ناشی از خودکشی در میان چه جنسی بیشتر است؟

الف. زنان- زنان ب. مردان- زنان ج. هر دو مساوی می‌باشند د. زنان- مردان

۱۹. به نظر کراپلین کدام بیماری اغلب در نوجوانی، با دوره‌های طولانی از ناتوانی شدید اجتماعی و کارکرد مشخص می‌شود؟

الف. اسکیزوفرنی ب. جنون زودرس ج. جنون مانیک- دپرسیو د. روان گسیختگی

۲۰. به نظر کراپلین کدام مورد از محدودیتهای مفهوم جنون زودرس نمی‌باشد؟

الف. هذیان و توهمات شدید مشخصه عود آن می‌باشد.

ب. بیماری محدود به جوانترها نمی‌باشد.

ج. در برخی افراد، بهبودی ایجاد می‌شود.

د. همیشه به زوال عقلی ختم نمی‌شود.

۲۱. میزان کلی خودکشی در اسکیزوفرنیا در حدود چند درصد می‌باشد؟

الف. ۲ تا ۱۰ درصد ب. ۵ درصد ج. ۵ تا ۱۰ درصد د. ۱۰ درصد

۲۲. عوارض کلرپرومازین که به نشانه‌های خارج هرمی معروف می‌باشند کدام مورد می‌باشد؟

الف. خشکی دهان و گلو ب. نشانه‌های پارکینسون و حرکت پریشی دیررس

ج. آشفتگی بینایی د. آسیب مهم به سیستم ایمنی مهم

۲۳. اختلالات شخصیت پارانوئید، اسکیزوئید و اسکیزوتایپال در کدام طبقه از دسته‌بندی DSM-IV قرار می‌گیرد؟

الف. هیجانی، خودنما و پرزرق و برق ب. ترسو یا مضطرب

ج. عجیب و غریب یا نامتعارف د. فعل پذیر- پرخاشگر

۲۴. کدام اختلال به اختلال شخصیت اسکیزوفرنی گونه معروف است؟

الف. اسکیزوئید ب. اسکیزوتایپال ج. پارانویایی د. مرزی

۲۵. نام دیگر اختلال شخصیت ضد اجتماعی چه می باشد؟

- الف. نارسیس ب. هیستریک ج. اسکیزوفرنی شبه نروتیک د. سایکوپات
۲۶. کمک به درمانجو جهت کنار آمدن با مشکلات خانوادگی و خارج خانوادگی، شامل کدام نوع درمان برای اختلال شخصیت ضد اجتماعی می باشد؟

- الف. روان درمانی ب. آموزش آگاهی هیجانی
- ج. رویکرد چند سیستمی مبتنی بر خانواده د. بهبودی مشکلات ارتباطی
۲۷. طبق طبقه بندی DSM-TV چند درصد وزن بدن مبتلا به بی اشتهایی روانی از دست می رود؟
- الف. ۵ تا ۱۰ درصد ب. ۱۵ درصد
- ج. ۱۰ درصد د. ۱۵ تا ۲۰ درصد

۲۸. کدام گزینه در مورد پراشتهایی روانی صحیح نمی باشد؟

- الف. افراد مبتلا در مورد عدم جذابیت حساس و ترس از چاق شدن دارند
- ب. تلاشهای آنان برای مقابله با چاقی راحتتر از بی اشتهایان روانی است
- ج. دوره های پرخوری تکراری
- د. رفتارهای نامناسب جبرانی

۲۹. طبق نظریه زیست شناختی عامل ایجاد احساس گرسنگی چه چیزی می باشد؟

- الف. سطح پایین سر و تونین ب. هیپوتالاموس شکمی
- ج. تعادل میان دو ناحیه هیپوتالاموس د. هیپوتالاموس جانبی

۳۰. کدام مرحله از خواب Non-REM خواب عمیق نامیده می شود؟

- الف. مرحله اول ب. مرحله دوم و سوم ج. مرحله سوم و چهارم د. مرحله چهارم

۳۱. دور باطل اضطراب - بی خوابی مربوط به کدام از انواع بد خوابی ها می باشد؟

- الف. بی خوابی اولیه ب. حمله خواب
- ج. پر خوابی اولیه د. بد خوابی

۳۲. بد خوابی و نابهنجاری های همراه خواب ناشی از کدام اختلال خواب می باشد؟

- الف. اختلال مربوط به اختلال روانی دیگر
- ب. اختلال های اولیه خواب
- ج. اختلال ناشی از یک بیماری جسمانی
- د. اختلال ناشی از مواد

۳۳. وقفه های تنفسی ۱۰ ثانیه ای موقتی که در طی خواب بوجود می آید چه نامیده می شود؟

- الف. نارکولپسی ب. کابوس ج. آپنه د. وحشت شبانه

۳۴. در درمان کودکان و نوجوانان مبتلا به اختلال هویت جنسی، از کدام یک از روشهای روان درمانی استفاده نمی‌شود؟

الف. جلسات آموزش رفتارهای مربوط به هویت جنسی واقعی

ب. آموزش والدین

ج. استفاده از برنامه‌های رفتاری جهت تقویت رفتارهای مربوط به جنس واقعی

د. روان تحلیل‌گری

۳۵. کدام مورد از اختلالات بدکاری جنسی از نظر جامعه مضر و نامناسب شمرده می‌شود؟

الف. پارافیلیاها

ب. اختلال ناشی از مواد

ج. اختلال تحریک جنسی

د. اختلال مربوط به درد جنسی

۳۶. بهترین درمان مبدل پوشی کدام مورد می‌باشد؟

الف. روان درمانی

ب. استفاده از داروی سیلدنافیل

ج. خانواده درمانی

د. بیزار درمانی

۳۷. آشفتگی زبانی شامل کدام یک از ویژگیهای آلزایمر می‌باشد؟

الف. آمنزی

ب. آپراکسی

ج. آفازی

د. آگنوزیا

۳۸. شروع MS به شکل بدخیم از چه سنی می‌باشد؟

الف. قبل از ۵۰ سالگی

ب. ۴۰ سالگی

ج. ۳۰-۴۰ سالگی

د. ۶۰-۵۰ سالگی

۳۹. اولین اختلال شایع عصب شناختی کدام مورد می‌باشد؟

الف. صرع

ب. صدمات سر

ج. سکته

د. پارکینسون

۴۰. ضایعات در کدام قسمت مغز ۹۰٪ موارد باعث ایجاد اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهم شنوایی می‌شود؟

الف. لوب تمپورال نیمکره چپ

ب. لوب تمپورال طرف راست

ج. پرده لوب فرونتال

د. بطن‌های مغزی

ج	1
ب	2
الف	3
ب	4
الف	5
ب	6
الف	7
الف	8
الف	9
ج	10
ب	11
ب	12
ب	13
ب	14
د	15
الف	16
ج	17
د	18
ب	19
الف	20
د	21
ب	22
ج	23
ب	24
د	25
ج	26
ب	27
ب	28
الف	29
ج	30
الف	31
ب	32
ج	33
د	34
الف	35
د	36
ج	37
ب	38
ج	39
الف	40

۱- تمایز اختلال عاطفی فصلی با اختلال افسردگی اساسی در چیست؟

۰ طول مدت اختلال عاطفی فصلی کوتاهتر است.

۰۲ اختلال عاطفی فصلی، یک حالت فصلی است و در زمستان رخ می دهد.

۰۳ طول مدت اختلال افسردگی اساسی کوتاهتر است.

۰۴ تفاوت چندانی ندارد.

۲- در کدام یک از انواع افسردگی نشانه ها شدیدتر و میزان بهبودی کمتر است؟

۰ افسردگی درونزاد

۰۲ افسردگی برونزاد

۰۳ افسردگی مضاعف

۰۴ افسردگی اساسی

۳- بر طبق طبقه بندی DSM-IV-TR در اختلال دو قطبی نوع II کدام دوره ها (مانی یا افسردگی) مسلطند؟

۰ دوره های افسردگی مسلط هستند.

۰۲ دوره های مانیا شدیدتر است.

۰۳ افراد دوره های متغیری از افسردگی و مانیا را تجربه می کنند.

۰۴ نسبت هر دو برابر است.

۴- طبق مدل شناختی، چه عواملی موجب دوره هایی از افسردگی و مانیا (اختلال دوقطبی) می شوند؟

۰ عزت نفس و اعتماد به نفس بالا

۰۲ اضطراب بالا و طرحواره

۰۳ توهم ها و هذیان ها

۰۴ معیارهای غیر واقع گرایانه در مورد موفقیت

۵- غم ناشی از مرگ عزیزان و پایان یک رابطه محبت آمیز چه نام دارد؟

۰ داغیدگی

۰۲ افسردگی

۰۳ سوگ

۰۴ موارد الف و ج

۶- جمله «همیشه برای من رخ می دهد» مربوط به کدام نوع اسناد است؟

۰ اسناد درونی

۰۲ اسناد کلی

۰۳ اسناد پایدار

۰۴ اسناد کلی و پایدار

۷- ناتوانی مربوط به بیماری اسکیزوفرنی بیشتر ناشی از فقدان چه نقص هایی است؟

۰ زیستی

۰۲ شناختی

۰۳ شناختی- رفتاری

۰۴ رفتاری

۸- به عقیده بلولر اسکیزوفرنیا بیشتر تحت تأثیر چه عواملی به وجود می آید؟

۱. تحت نفوذ پیشرفت های آسیب شناسی بالینی
۲. تحت تأثیر عوامل روانشناختی
۳. بیشتر نشانه های سایکوزی این بیماری مدنظر بود.
۴. به نظر او هذیانها و توهمات، پدیده های اولیه و اصلی بودند.

۹- ویژگی نوع کاتاتونیک اسکیزوفرنیا در کدام گزینه آمده است؟

۱. آشفتگی های خلقی
۲. آشفتگی های گفتاری
۳. آشفتگی روانی- حرکتی بارز
۴. هذیانهای پارانوئیدی

۱۰- در نیمکره شمالی و جنوبی افزایش بیماری اسکیزوفرنی در بین متولدین چه ماه هایی دیده می شود؟

۱. متولدین ماه های آخر زمستان تا اول بهار
۲. متولدین آخر تابستان
۳. متولدین ماه های اول بهار
۴. متولدین اول تابستان

۱۱- براساس مطالعات تغییرات ساختاری در بخش فرونتال مغز، حجم کوچکتر گیروسی استریت با کدام یک از موارد زیر ارتباط دارد؟

۱. اختلال در تفکر
۲. ناسازگاری اجتماعی
۳. توهمات شنوایی
۴. رفتار آشفته

۱۲- میزان بالایی از اسکیزوفرنیا در بین چه گروه هایی دیده می شود؟

۱. گروه های اجتماعی- اقتصاد بالاتر
۲. در خانواده های سرد و مستبد
۳. طبقات اجتماعی- اقتصادی متوسط
۴. گروه های اجتماعی- اقتصادی پائین تر

۱۳- طبق طبقه بندی DSM-IV-TR، کدام اختلال زیر در دسته سوم (ترسو یا مضطرب) اختلالات شخصیت قرار می گیرد؟

۱. اختلال شخصیت پارانوئید
۲. اختلال شخصیت وابسته
۳. اختلال شخصیت اسکیزوئید
۴. اختلال شخصیت اسکیزوتایپال

۱۴- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های تشخیصی اختلال شخصیتی مرزی محسوب نمی شود؟

۱. احساس خالی بودن
۲. فرار از روابط نزدیک
۳. آشفتگی هویت
۴. خود آسیب زنی عمدی

۱۵- کدام گزینه به نظریه یانگ و لیندمن در مورد طرحواره های مربوط به اختلالات شخصیت مربوط نمی شود؟

۱. حفظ طرحواره ۲. اجتناب از طرحواره ۳. جبران طرحواره ۴. فقدان طرحواره

۱۶- حجم ماده خاکستری پره فرونتال افرادی که به اعمال ضداجتماعی اشتغال داشتند چه تغییری نشان می دهد؟

۱. افزایش می یابد. ۲. کاهش می یابد. ۳. تغییری نمی کند. ۴. رشد نمی کند.

۱۷- از نظر راث و همکاران برای افراد مبتلاء به اختلال شخصیت که سن پایین تر از ۳۰ سال دارند، مهمترین مسئله چه احتمالی است؟

۱. افسردگی ۲. خودکشی ۳. خود آسیب زنی ۴. روان پریشی

۱۸- در اختلالات شخصیت مؤثرترین مداخلات روانشناختی کدامند؟

۱. آنهایی که به خانواده معطوف می شوند. ۲. رویکرد مبتنی بر همسالان
۳. مداخلات مبتنی بر همسالان ۴. آموزش مهارت اجتماعی و حل مسئله

۱۹- اختلال بی اشتهایی و پراشتهایی روانی معمولاً از چه زمانی بروز می کند؟

۱. پس از یک دوره رژیم سخت غذایی در افرادی که از چاق شدن می ترسند.
۲. بعد از قرار گرفتن در موقعیت اضطراب آور.
۳. وقتی افراد از لاغری مفرط در عذاب باشند.
۴. از زمانی که رژیم غذایی افراد تغییر می کند.

۲۰- بارزترین و فوری ترین پیامد کنترل و کاهش وزن مربوط به بی اشتهایی روانی چیست؟

۱. زبرشدن پوست ۲. آمنوریا ۳. فشار خون پایین ۴. خشکی مو

۲۱- مطالعات نشان داده اند که ۷۴ درصد واریانس رفتارهای بی اشتهایی به چه عواملی مربوط می شوند؟

۱. عوامل زیست شناختی ۲. روانشناختی ۳. ژنتیکی ۴. شناختی

۲۲- براساس طرحواره های خویشتن مربوط به وزن، اشخاص چگونه ارزیابی می شوند؟

۱. براساس صلاحیت فردی ۲. با افکار و احساساتشان
۳. براساس چاقی یا لاغریشان ۴. براساس تجارب فردی

۲۳- در تبیین روان تحلیلی، بیماران مبتلا به بی اشتها بی روانی فاقد کدام یک از موارد زیر می باشند؟

۱. احساس وابستگی به اطرافیان و رابطه به آنها
۲. فاقد احساس نشاط و شادی
۳. خود انضباطی
۴. فاقد احساس خودمختاری و خود بودن

۲۴- بر طبق آمار، نیمی از بیماران که به طور معمول تحت درمان چاقی قرار می گیرند دچار چه عارضه هایی هستند؟

۱. مصرف مواد
۲. افسردگی و اضطراب خفیف
۳. وسواس- جبری
۴. اضطراب بالا

۲۵- کدام نوع خواب حافظه را تحکیم می بخشد؟

۱. مرحله دوم خواب non-REM
۲. non-REM
۳. REM
۴. مرحله چهارم non-REM

۲۶- کدام یک از روش های زیر، شیوه مؤثری در درمان بی خوابی اولیه است؟

۱. درمان آرمیدگی
۲. شرطی شدن مجدد
۳. درمان مجدد محدودسازی خواب
۴. دارو درمانی

۲۷- پر خوابی اولیه چه زمانی به عنوان یک اختلال مطرح می شود؟

۱. وقتی که بروز خانوادگی داشته باشد.
۲. زمانی که علت دیگری برای پر خوابی فرد نمیتوان یافت.
۳. زمانی که فرد شکایت عمدهای از خواب آلودگی به مدت ۲ ماه دارد.
۴. زمانی که فرد مشکلاتی در زمینه های مختلف زندگی پیدا نمی کند.

۲۸- نارکولپسی حداقل در چه مدتی قابل تشخیص است؟

۱. ۱ ماه
۲. ۳ ماه
۳. ۲ هفته
۴. ۶ هفته

۲۹- تفاوت اختلال وحشت شبانه و خواب گردی در کدام گزینه زیر آمده است؟

۱. در وحشت شبانه فرد به طور معمولی بیدار می شود، رویای دیده شده را به یاد نمی آورد.
۲. در اختلال خوابگردی فرد با هشیاری به یکسری اعمال پیچیده دست میزند.
۳. در اختلال خوابگردی، فرد رویای زیادی را تجربه می کند.
۴. در وحشت شبانه فرد رویای دیده شده را به خاطر می آورد.

۳۰- برای درمان وحشت شبانه و خوابگردی چه عواملی دارای اهمیت است؟

۱. بررسی سوابق خوابگردی
۲. بررسی طول مدت ابتلاء به این اختلال ها
۳. بررسی وضعیت زندگی و خانوادگی
۴. بررسی تاریخچه بیماری

۳۱- اولین اختلال در طبقه اختلالات مربوط به میل جنسی کدام یک از گزینه های زیر می باشد؟

۱. اختلال میل جنسی کم کار
۲. انزوال زودرس
۳. واژینیسم
۴. اختلال بیزاری جنسی

۳۲- زمانی که فرد با رفتارهای خشونت آمیز و آسیب رسان نسبت به موضوع جنسی خود، به برانگیختگی جنسی دست می یابد کدام اختلال مطرح است؟

۱. نمایشگری جنسی
۲. مازوخیسم
۳. سادیسم جنسی
۴. تمایل جنسی نسبت به کودکان

۳۳- در تبیین شناختی اختلال نعوظی، از نظر بن کرافت چه عاملی عملکرد جنسی فرد را تحت تأثیر قرار می دهد؟

۱. اضطراب
۲. ترس
۳. تمایلات همجنس گرایانه
۴. تمایلات پرخاشگرانه

۳۴- اختلال هویت جنسی معمولاً از چه سنی قابل ردیابی هستند؟

۱. قبل از ۶ سالگی
۲. ۴ سالگی
۳. قبل از ۳ سالگی
۴. ۱۲ سالگی

۳۵- نوجوانان و بزرگسالان مبتلا به GID چه اشتغال ذهنی در مورد جنسیت شان دارند؟

۱. از اندامهای جنسی، جنس مقابل متنفرند.
۲. معتقدند که با یک جنسیت غلط به دنیا آمده اند.
۳. احساس جذابیت نمی کنند.
۴. به تغییر جنسیت عمل جراحی فکر می کنند.

۳۶- اختلال عصب شناختی نتیجه آسیب به چه بخشهایی از بدن می باشد؟

۱. دستگاه عصبی خودمختار
۲. دستگاه عصبی مرکزی
۳. سلولهای عصبی
۴. بخش پیکری

۳۷- در فرآیندهای عصب شناختی بیماری آلزایمر، در بخش ساختاری، لکه های آمیلوئید، چه عاملی را سبب می شوند؟

۱. باعث مرگ نرونی می شوند.
۲. باعث ایجاد کانالهایی در غشاء می شوند.
۳. باعث آسیب پروتئین آمیلوئید می شوند.
۴. موجب خروج کلسیم از نرون می شوند.

۳۸- مشخصه شایع علائم جسمی بیماری MS کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. از بین رفتن کارکرد پاها
۲. آسیب شناختی
۳. فقدان کنترل مثانه
۴. انقباض عضلانی به ویژه در اندامهای بالاتنه

۳۹- در سبب شناسی بیماری پارکینسون، علت بروز بیماری کدام یک از موارد زیر می باشد؟

۱. شخصیت غیرقابل انعطاف
۲. آشفتگی هیجانی
۳. ضربه های روانی
۴. فقدان سلولهای رنگدانه های در جسم سیاه

۴۰- شایعترین اختلال روانشناختی در بیماران صرعی چیست؟

۱. اختلالات خلقی
۲. اختلالات شخصیتی
۳. افسردگی
۴. اضطراب فراگیر

1	ج
2	هـ
3	الف
4	د
5	د
6	هـ
7	ج
8	ج
9	هـ
10	الف
11	ج
12	د
13	ج
14	ج
15	د
16	ج
17	ج
18	الف
19	الف
20	ج
21	هـ
22	هـ
23	د
24	ج
25	هـ
26	ج
27	ج، د
28	ج
29	الف
30	هـ
31	الف
32	هـ
33	الف
34	هـ
35	ج
36	ج
37	الف، ج
38	د
39	د
40	ج

۱- حالت خفیف تر اختلال دو قطبی چه نام دارد؟

۱. ادواری خویی ۲. افسردگی فصلی ۳. افسرده خویی ۴. هیچکدام

۲- افسردگی درون زاد را می گویند.

۱. افسردگی مضاعف ۲. افسردگی بدون مالیخولیا
۳. افسردگی همراه با مالیخولیا ۴. افسردگی اساسی

۳- سطوح پایین کدام انتقال دهنده موجب افسردگی می شود؟

۱. دوپامین ۲. استیل کولین ۳. سروتونین ۴. نور اپی نفرین

۴- از نظر لوینسون تبیین نظریه های رفتاری در مورد علت افسردگی چیست؟

۱. میزان کم تقویت اجتماعی مثبت ۲. وابستگی به دیگران
۳. تثبیت در غم و اندوه ۴. عزت نفس پایین

۵- کدام گزینه مربوط به مثلث شناختی نیست؟

۱. باورهای مربوط به آینده ۲. باورهای مربوط به رخدادها یا افراد
۳. باورهای مربوط به خود ۴. باورهای مربوط به گذشته

۶- نتیجه گیری های منفی کلی درباره توانایی یا عملکرد بر حسب یک مورد جزء کدام پنج خطای منطقی فرد افسرده است؟

۱. انتزاع گزینشی ۲. تعمیم مفرط ۳. استنباط دلخواه ۴. شخصی سازی

۷- کدام یک از داروها عمر انتقال دهنده های عصبی را در افسردگی افزایش می دهد؟

۱. TCA ۲. SSRI ۳. Orap ۴. MAOI

۸- میزان سروتونین پایین همراه با نور اپی نفرین بالا منجر به بروز کدام اختلال می گردد؟

۱. مانیا ۲. افسردگی ۳. اسکیزوفرنی ۴. سایکوز

۹- شدیدترین اختلال روانی کدام است؟

۱. افسردگی ۲. اسکیزوفرنی ۳. دوقطبی ۴. مانیا

۱۰- هبفرنیا کدام نوع اسکیزوفرنی است؟

۱. کاتاتونیک ۲. باقی مانده ۳. آشفته ۴. پارانویید

۱۱- اسکیزوفرنی مزمن چه نشانه هایی دارد؟

۱. شروع ناگهانی
۲. احتمال بهبودی زیاد
۳. پیش آگهی خوب
۴. پیش آگهی بد

۱۲- مشهورترین نشانه اسکیزوفرنی چیست؟

۱. آشفتگی در فرایندهای تفکر
۲. مکالمات فاقد هماهنگی
۳. هذیان بزرگ منشی
۴. هذیان کنترل

۱۳- مصرف کدام ماده مخدر منجر به بروز بعدی اسکیزوفرنی می شود؟

۱. تریاک
۲. کوکائین
۳. شیشه
۴. هروئین

۱۴- کدام مطالعه تصویر برداری نخستین و قانع کننده ترین داده ها را از این که اسکیزوفرنی یک بیماری مغزی واقعی است به دست داده است؟

۱. FMRI
۲. SPET
۳. rCBF
۴. CT

۱۵- ضایعات در کدام قسمت مغز باعث ایجاد اسکیزوفرنی نوع پارانوئید همراه با توهم شنوایی شدید می شود؟

۱. لوب پیش پیشانی
۲. لوب گیجگاهی
۳. لوب تمپورال
۴. لوب پس سری

۱۶- حجم کوچکتر گيروس استریت در اسکیزوفرنها با کدام یک از ناسازگاری های زیر ارتباط دارد؟

۱. رفتاری
۲. اجتماعی
۳. تحصیلی
۴. جنسی

۱۷- مصرف کدام ماده مخدر باعث بالا رفتن دوپامین می شود؟

۱. شیشه
۲. کراک
۳. تریاک
۴. حشیش

۱۸- کدام یک از داروهای زیر فقط بر روی نشانه های مثبت اسکیزوفرنی اثر می گذارد؟

۱. کلوزاپین- هالوپریدول
۲. کلرپرومازین- هالوپریدول
۳. دیازپام- کلر پرومازین
۴. کلوزاپین- کلرپرومازین

۱۹- روابط شخصی بی ثبات و شدید ویژگی کدام اختلال شخصیت می باشد؟

۱. وسواسی- جبری
۲. خودشیفته
۳. مرزی
۴. پارانوئید

۲۰- عمل در جهت عکس محتوای طرحواره جزء کدام یک از سه فرایند طرحواره است؟

۱. جبران طرحواره ۲. حفظ طرحواره ۳. اجتناب از طرحواره ۴. هیچکدام

۲۱- کدام اختلال شخصیت با بالا رفتن سن و از دست دادن مقام دچار افسردگی می شود؟

۱. نمایشی ۲. خودشیفته ۳. مرزی ۴. ضد اجتماعی

۲۲- سطح پایین کدام انتقال دهنده عصبی و کاهش حجم ماده کدام قسمت مغز در ایجاد شخصیت ضد اجتماعی نقش دارد؟

۱. دوپامین - پیش پیشانی ۲. سروتونین - پس سری
۳. دوپامین - پس سری ۴. سروتونین - پیش پیشانی

۲۳- شروع نوع بدخیم بیماری MS معمولاً در چه سنینی رخ می دهد؟

۱. قبل از ۱۵ سالگی ۲. بعد از ۴۰ سالگی ۳. ۳۵ سالگی ۴. بعد از ۲۰ سالگی

۲۴- رایج ترین نشانه های صدمات بسته چیست؟

۱. آسیب های حافظه ای ۲. آسیب به مهارت های زبانی
۳. آسیب های شناختی ۴. نقص های شناختی و عصب - رفتاری

۲۵- ویژگی زیر مربوط به کدام اختلال می باشد؟ (دوری گزین و علاقه مند شدید به ایجاد رابطه با دیگران)

۱. اسکیزوئید ۲. اسکیزوتایپال ۳. اجتنابی ۴. پارانوئید

۲۶- شایع ترین اختلال شخصیت کدام است؟

۱. مرزی ۲. هیستریک ۳. وابسته ۴. اجتنابی

۲۷- فوری ترین پیامد بی اشتهایی روانی چیست؟

۱. قطع دوره های ماهیانه ۲. لاغری شدید ۳. ضعف جسمانی ۴. بدشکلی بدن

۲۸- ۸۰ الی ۹۰ درصد افراد مبتلا به پراشتهایی روانی بعد از خوردن غذا جهت کنترل وزنشان چه کاری را انجام می دهند؟

۱. استفاده از ملین ها ۲. استفراغ عمدی ۳. ورزش های شدید ۴. همه موارد

۲۹- تنقیه کردن و روزه داری به ترتیب جزء کدام یک از انواع پراشتهایی هستند؟

۱. غیر تخلیه ای - تخلیه ای ۲. تخلیه ای - تخلیه ای
۳. تخلیه ای - غیر تخلیه ای ۴. غیر تخلیه ای - غیر تخلیه ای

۳۰- مهمترین پیامد رفتارهای جبرانی پراشتهایی روانی چیست؟

۱. عدم تعادل الکترولیت
۲. مشکلات گوارشی
۳. آسیب شکمی
۴. آسیب به پشت دندانها

۳۱- سطح پایین کدام انتقال دهنده عصبی منجر به جستجوی کربوهیدراتها و دوره های پرخوری می شود؟

۱. دوپامین
۲. نور اپی نفرین
۳. استیل کولین
۴. سروتونین

۳۲- از نظر فروید تثبیت در کدام مرحله رشد موجب بی اشتهایی روانی می شود؟

۱. جنسی
۲. تناسلی
۳. دهانی
۴. مقعدی

۳۳- کودکانی که دچار شب ادراری و یا راه رفتن در خواب هستند معمولا در کدام مرحله از خواب می باشند؟

۱. سوم و دوم
۲. اول و چهارم
۳. سوم و چهارم
۴. اول و دوم

۳۴- کدام اختلال خواب موجب مشکل در کارکردهای اجتماعی، شغلی فرد می شود؟

۱. حمله خواب
۲. پرخوابی اولیه
۳. بی خوابی اولیه
۴. اختلال خواب دوره شبانه روزی

۳۵- مهمترین درمان ناركولپسی چیست؟

۱. شوک درمانی
۲. آرمیدگی
۳. تمرکز
۴. دارو درمانی

۳۶- کدام دارو برای درمان کابوس در خواب تجویز می شود؟

۱. سه حلقه ای
۲. زولپیدم
۳. زالپلون
۴. بنزودیازپین

۳۷- نمایش آلت به فرد غریبه ای که انتظار این کار را از او ندارد جزء کدام نوع پارافیلی ها است؟

۱. یادگارخواهی جنسی
۲. سادیسم جنسی
۳. نمایشگری جنسی
۴. تماشاگری جنسی

۳۸- مهمترین دارو برای درمان اختلال نعوظی چیست؟

۱. فیناستراید
۲. دیازپام
۳. زالپلون
۴. ویاگرا

۳۹- بیزاری درمانی در مبدل پوشی معمولا چگونه انجام می شود؟

۱. شوک درمانی
۲. دارو درمانی
۳. گفتار درمانی
۴. همه موارد

۴۰- هویت جنسی زنانه در مردان طبق تبیین رویداد تحلیلی ناشی از چیست؟

۱. وابستگی به مادر

۲. بیزاری از پدر

۳. اضطراب جدایی مفرط اولیه

۴. افسردگی

1	الف
2	ج
3	ج
4	الف
5	د
6	ب
7	د
8	الف
9	ب
10	ج
11	د
12	الف
13	ب
14	د
15	ج
16	ب
17	د
18	ب
19	ج
20	الف
21	ب
22	د
23	ب
24	د
25	ج
26	ج
27	الف
28	ب
29	ج
30	الف
31	د
32	ج
33	ج
34	ج
35	د
36	الف
37	ج
38	د
39	الف
40	ج

۱- بر طبق نتایج پژوهش های برونیش و ویچن ۱۹۹۴ چند درصد افرادی که هیچ اختلال روانی نداشتند تفکراتی در مورد خودکشی نشان دادند؟

۰۱ ۲ درصد ۰۲ ۸ درصد ۰۳ ۶۵ درصد ۰۴ ۶۹ درصد

۲- کدام دانشمند، احساس گناه، نشانه های هذیانی افسرده وار و ناآرامی درونی و بی قراری را از جمله ویژگی های روانشناختی افرادی می داند که تلاش هایی برای خودکشی دارند؟

۰۱ ابرامسون ۰۲ بک ۰۳ دورکیم ۰۴ ولفر سدورف

۳- در اواسط دهه ۱۹۸۰ کدام اختلال بوسیله روزنتال و همکارانش مطرح گردید؟

۰۱ اختلال دو قطبی ۰۲ اختلال عاطفی فصلی
۰۳ اختلال افسردگی اساسی ۰۴ اختلال ادواری خویی

۴- سطح پایین ملاتونین باعث ایجاد کدام حالت در فرد می شود؟

۰۱ خلق پایین ۰۲ هیپومانی ۰۳ خلق بالا و سرخوشی ۰۴ غمگینی مفرط

۵- کدام دسته از اختلالات تاریخچه پژوهشی کوتاهی را به خود اختصاص داده است؟

۰۱ عاطفی فصلی ۰۲ افسرده خویی ۰۳ دو قطبی نوع I ۰۴ مانیک دپرسیو

۶- فرد مبتلا به کدام اختلال ممکن است بوسیله اعمال دیگران ناکامی را تجربه کند؟

۰۱ مانیک ۰۲ افسردگی اساسی ۰۳ اسکیزوفرنی ۰۴ افسردگی فصلی

۷- کدامیک از اختلالات زیر اختلال مزمنی است که حداقل ۲ سال ادامه دارد و فرد مبتلا، هیپومانی را به صورت دوره ای تجربه می کند ؟

۰۱ دو قطبی ۰۲ عاطفی فصلی ۰۳ ادواری خویی ۰۴ افسردگی

۸- لیتیوم برای درمان کدام اختلال موثر می باشد ؟

۰۱ استرس ۰۲ اضطراب ۰۳ افسردگی ۰۴ دو قطبی

۹- کدام نوع اسکیزوفرنی هم اکنون در کشورهای صنعتی به ندرت دیده می شود؟

۰۱ آشفته ۰۲ پارانوئید ۰۳ باقی مانده ۰۴ کاتاتونیک

۱۰- فقر گفتار ، بی حالتی عاطفی ، فقدان لذت ، انزوا از ویژگی کدام دسته از اسکیزوفرنی می باشد ؟

۰۱ پارانوئید ۰۲ آشفته ۰۳ مثبت ۰۴ منفی

۱۱- بر اساس مطالعات لیدل و همکاران کاهش RCBF در کرتکس پره فرونتال میانی و چپ منجر به چه عاملی می شود؟

۱. فقر روانی-حرکتی
۲. افزایش مسائل مربوط به حرکت
۳. کاهش سازمان نیافتگی
۴. افزایش هیجانات

۱۲- بر چه اساسی می توان ناهماهنگی دو قلوهای یک تخمکی را درابتلا به اسکیزوفرنی تمیز داد؟

۱. بررسی بطن ها و کاهش حجم کرتکس تمپورال
۲. بررسی لوب پاریتال تحتانی چپ
۳. کاهش فعالیت آلفا در نیمکره چپ
۴. افزایش حجم کرتکس تمپورال

۱۳- بر طبق پژوهش بارچ و همکاران (۲۰۰۲) کدام ناحیه در بیماران اسکیزوفرنی در دو حافظه کاری و بلند مدت کاهش فعالیت را نشان می دهد؟

۱. کرتکس سینگولار قدامی دو طرف
۲. لوب تمپورال میانی
۳. کرتکس پره فرونتال دورسولا ترال راست
۴. کرتکس پره فرونتال میانی و چپ

۱۴- ممانعت از جذب کدام دسته از داروها در مکان گیرنده پس سیناپسی از انتقال دوپامین جلوگیری می کند؟

۱. ترازادون
۲. فنوباریتال
۳. سرتالین
۴. فنوتیازین

۱۵- بررسی های پس از مرگ بیماران اسکیزوفرنیک کاهش در تراکم نورون های کدام قسمت را نشان می دهند؟

۱. هیپوکامپ
۲. تالاموس
۳. پیشانی
۴. هیپوتالاموس

۱۶- چه کسی معتقد بود که هذیان ها، اعمال گفتاری خالی هستند که به دنیا و خویشتن معطوف نیستند و آنها نماد چیزی نیستند؟

۱. بنتال
۲. همزلی
۳. بریوس
۴. آدل دیاموند

۱۷- کدام دارو اثر مستقیمی بر روی توهمات و هذیان ها دارد؟

۱. کلوزاپین
۲. ترازادون
۳. فلووکسامین
۴. پروکستین

۱۸- یبوست، آشفستگی های بینایی و کاهش یا افزایش وزن از عوارض کدام دارو محسوب می شود؟

۱. دسی پرامین
۲. پروزاک
۳. کلوزاپین
۴. کلرپرومازین

۱۹- کدام یک از موارد زیر از ویژگی های تشخیصی اختلال شخصیتی اسکیزوتایپال محسوب می شود؟

۱. سوء ظن
۲. فاقد انعطاف پذیری
۳. حساسیت
۴. از نظر هیجانی سرد

۲۰- کدام گزینه جز ویژگی های شخصیتی اختلال اسکیزوئید محسوب می شود؟

۱. خسته کردن دیگران
۲. توانایی در ابراز مستقیم خشم
۳. ناپهنجاری در تفکر
۴. فقدان اعتماد به نفس

۲۱- شیوع کدام دسته از اختلالات شخصیتی، ۳ درصد جمعیت عمومی را شامل می شود؟

۱. دوری گزین
۲. مرزی
۳. خودشیفته
۴. اسکیزوتایپال

۲۲- در کدام دسته از اختلالات شخصیتی، تحت تاثیر استرس، واقعیت سنجی فرد به آسانی درهم می شکند؟

۱. دوری گزین
۲. وابسته
۳. نمایشی
۴. پارانویید

۲۳- شیوع اختلال شخصیت نمایشی چند درصد می باشد؟

۱. ۳ تا ۴ درصد
۲. ۲ تا ۳ درصد
۳. ۱ درصد
۴. ۲/۵ درصد

۲۴- رفتارهایی نظیر بریدن بازوها، پاها و سوزاندن، در کدام دسته از اختلالات شخصیتی مشاهده می گردد؟

۱. ضد اجتماعی
۲. اختلال شخصیت مرزی
۳. اسکیزوئید
۴. وسواسی-جبری

۲۵- در کدام یک از اختلالات شخصیتی افراد در روابط بین فردی، به درجه بالایی از محبت نیاز دارند؟

۱. اسکیزوئید
۲. خود شیفته
۳. نمایشی
۴. اجتنابی

۲۶- کدامیک از مشکلات روانشناختی در بین مبتلایان به بی اشتهایی روانی شایع می باشد؟

۱. اضطراب
۲. افسردگی شدید
۳. خود شیفتگی
۴. استرس

۲۷- تحریک کدام ناحیه باعث کاهش احساس گرسنگی می شود؟

۱. هیپوتالاموس
۲. تالاموس
۳. هیپوتالاموس شکمی
۴. هیپوتالاموس جانبی

۲۸- کدام مورد جز اهداف مداخلات درمانی شناختی محسوب می شود؟

۱. ایجاد جذابیت جسمانی
۲. کنترل فراخود
۳. ایجاد اتحاد درمانی
۴. رشد و پرورش خودمختاری

۲۹- در فاصله سنی ۲۵ تا ۴۴ سال مردها بطور متوسط چند کیلو گرم افزایش وزن دارند؟

۱. ۷
۲. ۵
۳. ۴
۴. ۲

۳۰- در کدام مرحله خواب non-REM مغز یک نوع الگوی فعالیتی متمایزی از امواج آهسته تر به همراه خیزک های سریعی از امواج نشان می دهد؟

۱. اول ۲. دوم ۳. سوم ۴. چهارم

۳۱- کدام مورد محرک اشتها و هوشیاری محسوب می شود؟

۱. سروتونین ۲. نوروترانسمیتر هیپوکرتین
۳. اپی نفرین ۴. دوپامین

۳۲- لیومان و همکاران ۱۹۹۱ شیوع اختلال نعوظی را برای سنین ۴۰ الی ۴۹ سالگی چند درصد برآورد کرده اند؟

۱. ۱۱ درصد ۲. ۷ درصد ۳. ۱۳ درصد ۴. ۱۸ درصد

۳۳- داروی ویاگرا در درمان کدام اختلال موثر واقع می شود؟

۱. انزال زودرس ۲. بیضاری جنسی ۳. میل جنسی کم کار ۴. نعوظ

۳۴- کدام گزینه جز عوارض جنبی داروی سیلدنافیل محسوب می شود؟

۱. کاهش ضربان قلب ۲. اختلال در دید رنگ ۳. برافروختگی چشم ها ۴. آشفته گی کلیوی

۳۵- کدام دانشمند به این نتیجه دست یافت که مردان مبدل پوش به احتمال بیشتری نسبت به مردان دیگر والدین خود را فاقد ویژگی های مربوط به نوع جنس ارزیابی می کردند؟

۱. بن کرافت ۲. مسترز ۳. نیوکامب ۴. جانسون

۳۶- در کدام نوع دمانس رفتارهای مشکل دار نظیر شگفتی واضح می باشند؟

۱. متوسط ۲. مبهم ۳. خفیف ۴. شدید

۳۷- ژن های موجود در کروموزوم های ۱۴، ۱۹، ۲۱ در ایجاد کدام بیماری دخالت دارند؟

۱. پارکینسون ۲. آلزایمر ۳. ام اس ۴. صرع

۳۸- عوامل خطر برای بروز زوال عقل در بیماران پارکینسونی شامل کدام مورد می شود؟

۱. جنسیت ۲. مدت زمان بیماری ۳. آستانه تحمل درد پایین ۴. ژنتیک

۳۹- بی خوابی از جمله مشکلات روانی مبتلایان به کدام نوع بیماری می باشد؟

۱. ام اس ۲. صرع ۳. پارکینسون ۴. آلزایمر

۴۰- کدام دارو جز داروهای ضد صرع محسوب می شود؟

۱. ترازودن

۲. سرتالین

۳. کاربامازپین

۴. پروکستین

1	ب
2	د
3	ب
4	ج
5	الف
6	الف
7	ج
8	د
9	د
10	د
11	الف
12	الف
13	ج
14	د
15	ج
16	ج
17	الف
18	د
19	الف
20	الف
21	د
22	ج
23	ب
24	ب
25	د
26	الف
27	ج
28	د
29	ج
30	ب
31	ب
32	الف
33	د
34	ب
35	ج
36	الف
37	ب
38	ب
39	ج
40	ج